



ที่ นม ๗๔๕๐๑/ว๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
อำเภอจันทราษ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแบบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ปี ๒๕๖๖

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลคลองเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้รับแจ้งจากอำเภอจันทราษได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งอัตราการเข้ารับวัคซีนที่มีความจำเป็นตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาเกิดระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง เช่น โรคหัด หัดเยอรมัน โปลิโอ คอตีบ ไอกรน ทำให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรง ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามแบบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ให้สามารถเข้ารับบริการอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ฯ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khlongmueang.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญตัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร. ๐๔๔-๗๕๖๑๘๖

ณัฐวดี ๐๘๐-๗๕๕๙๘๔๗

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2566



กำหนดการให้วัคซีนในเด็ก

| อายุ | วัคซีนที่ให้ | ข้อแนะนำ |
|----------------------------------|--|---|
| แรกเกิด | HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค) | ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล |
| 1 เดือน | HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) | เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี |
| 2 เดือน | DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) OPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) Rota1 (วัคซีนโรต้า) | ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งที่ 1 ในเด็กที่อายุมากกว่า 15 สัปดาห์ |
| 4 เดือน | DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) OPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota2 (วัคซีนโรต้า) | - ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง - ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์ |
| 6 เดือน | DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ-ตับอักเสบบี-ฮิบ) OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) Rota3 (วัคซีนโรต้า) | - ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในเด็กที่อายุมากกว่า 32 สัปดาห์ - ให้อาหารทารกได้รับวัคซีนโรคตาครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง |
| 9 เดือน | MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) | |
| 1 ปี | LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) | |
| 1 ปี 6 เดือน | DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ) OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) | |
| 2 ปี 6 เดือน | LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) | |
| 4 ปี | DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรณ) OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก) OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค) | ตรวจสอบประวัติและให้วัคซีนเฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่เป็นผลเป็น ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์ |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง) | HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี) | - ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน - กรณีเด็กหญิงที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก) | |

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

| ครั้งที่ | ช่วงอายุ 1-6 ปี | | ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป | | ข้อแนะนำ |
|----------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------|--|
| | เดือนที่ | วัคซีน | เดือนที่ | วัคซีน | |
| 1 | 0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก) | DTP-HB-Hib1 | 0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก) | dT1 | ให้วัคซีน IPV เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่เป็นผลเป็น ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์ |
| | | OPV1 | | OPV1 | |
| | | IPV | | IPV | |
| | | MMR1 | | MMR | |
| | | BCG | | BCG | |
| 2 | 1 | DTP-HB-Hib2 | 1 | HB1 | |
| | | OPV2 | | LAJE1 | |
| | | LAJE1 | | dT2 | |
| 3 | 2 | MMR2 | 2 | OPV2 | HB2 |
| | | | | HB2 | |
| 4 | 4 | DTP-HB-Hib3 | 7 | HB3 | |
| | | OPV3 | | dT3 | |
| 5 | 12 | DTP4 | 12 | OPV3 | LAJE 2 |
| | | OPV4 | | LAJE 2 | |
| | | LAJE 2 | | LAJE 2 | |

กำหนดการให้วัคซีนในผู้ใหญ่

| วัคซีน | กลุ่มเป้าหมาย | กำหนดการให้วัคซีน |
|---|---|---|
| dT | หญิงตั้งครรภ์ | 3 ครั้ง หรือตามประวัติการได้รับวัคซีน |
| | บุคคลอายุ 20, 30, 40 ปี (อายุลงท้ายด้วยเลข 0) | 1 ครั้ง ทุก 10 ปี |
| Influenza | หญิงตั้งครรภ์ (สามารถรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี) | 1 ครั้ง ทุกการตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป) |
| | บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เฉพาะช่วงรณรงค์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ | ปีละ 1 ครั้ง |
| | 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป | ปีละ 1 ครั้ง |
| | 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน | |
| 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน | | |
| 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป | | |
| 5. โรคออสติซึมและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) | | |
| 6. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) | | |
| 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ | | |
| MR | นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 เฉพาะช่วงรณรงค์ ผู้ใหญ่อายุ 20 - 40 ปี ได้แก่ | 1 ครั้ง |
| | 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน | 1 ครั้ง |
| MR | 2. บุคลากรทางทหาร/ตำรวจ | |
| | 3. ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | |
| | 4. กลุ่มวัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ | |
| | 5. ประชาชนทั่วไป | |
| | 6. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น | |
| | HB | บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข |

หมายเหตุ

1. วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้รับตามกำหนด สามารถให้ได้ทันทีเมื่อพบเด็ก
2. สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้ โดยไม่ต้องเริ่มนับใหม่
3. กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเด็กมารับวัคซีนตามกำหนดที่ได้รับตามกำหนด ภายใต้ระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามกำหนดการให้วัคซีนปกติ
4. กระบวนการจัดการวัคซีน เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่จัดหาและจ่ายวัคซีน วัคซีนคงคลังในแต่ละช่วงเวลา



ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข